

NAWÓZ WE

FOSACTIV jest nawozem dolistnym, zawierającym fosfor o wysokim stopniu biodyspozycyjności. Jest to preparat rozpuszczalny, rozprowadzany przez floemy (tyko), szybko i w całości wchłaniany przez roślinę razem z nawozami i pestycydami, z którymi może być jednocześnie stosowany.

Nierozcieńczony produkt nie powinien być używany. FOSACTIV powinien być używany zgodnie z zaleceniami. Należy używać produktu wcześniej rano lub późno wieczorem. Przechowywać w zabezpieczonych pojemnikach, w temperaturze powyżej 4°C.

Importer: CALFERT Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Tel/fax: 22-456-19-65
e-mail: biuro@calfert.pl

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.

Środki ostrożności: S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji przy zachowaniu w/w warunków przechowywania.
Data produkcji: 02/2017
Nr partii: ASC2307-17

SKŁAD	(% w/w)
Azot ogółem (2,0% azotanu amonu, 1,0% mocznika)	3%
Rozpuszczalne w wodzie P2O5	27%
Rozpuszczalne w wodzie K2O	11%
Rozpuszczalne w wodzie Bor	0,01%
Rozpuszczalne w wodzie Cu	0,02%
Rozpuszczalne w wodzie Mn	0,02%
Rozpuszczalne w wodzie Mo	0,01%
Rozpuszczalne w wodzie Zn	0,02%

masa netto:

1,3 kg
(=1L)



FOSACTIV

3 27 11 + MIKROELEMENTY

≡ KOMPATYBILNOŚĆ FOSACTIV jest kompatybilny z większością zwykłych stosowanych nawozów i produktów fitosanitarnych, z wyłączeniem preparatów zawierających miedź, siarkę i produktów alkalicznych (pH > 8). Zalecane jest wykonanie testu przed wymieszaniem.

≡ STOSOWANIE FOSACTIV może być stosowany za pomocą wszystkich opryskiwaczy. W celu polepszenia skuteczności nawożenia dolistnego zabieg należy wykonać rano lub wieczorem. Przy płynnym nawożeniu do podłoża produkt może być stosowany we wszystkich systemach nawożenia, w tym także kropelkowego.

FOSACTIV nie może być używany nierozcieńczony. Nie należy mieszać nawozu FOSACTIV z produktami alkalicznymi oraz zawierającymi siarczany, np. oleje mineralne, a także z fungicydami miedziowymi.

≡ MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 4 do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich warunkach (np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu. Produktu nie należy składować warstwowo. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia.

≡ OGRANICZONA GWARANCJA
Zobowiązania sprzedawcy i producenta ograniczają się do wymiany wadliwego produktu. ANI SPRZEDAWCA ANI PRODUCENT NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE OBRAŻENIA, STRATY MATERIALNE ANI USZKODZENIA. POWSTAŁE BEZPOŚREDNIO WSKUTEK LUB JAKO KONSEKWENCJA NIEPRAWIDŁOWEGO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM PRODUKTEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ POSŁUGIENIA SIĘ NIM. WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE I DOROZUMIANE, Z WYJĄTKIEM PISEMNEJ GWARANCJI PRODUCENTA, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.

≡ DAWKI I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU

UPRAWA	DAWKA	TERMIN STOSOWANIA
Truskawki	3-4l/ha w 1000 l wody	- Na początku okresu wegetacji (wiosna) stosować preparat rozcieńczony w 400-1000 l wody. 10 dni przed kwitnieniem stosować preparat rozcieńczony w 400-1000 l wody. - Powtórzyć oprysk 2-3 razy aż do początku wybarwiania owoców. 8 do 10 dni po sadzeniu (koniec lata).
Truskawki (frigo)	3-4l/ha w 1000 l wody	Moczenie/oprysk korzeni i liści (0,5 %) 6 do 10 dni po sadzeniu, co najmniej 4 zabiegów aż do początku wybarwiania owoców.
Drzewa i krzewy owocowe	3-4l/ha w 1000 l wody	Przed okresem kwitnienia 2 opryski w odstępie 8-14 dni. Powtórzyć zabieg 2-3 razy aż do początku wybarwiania owoców.
Salata, rukola i inne sałatki	2-3l/ha w 400 l wody	Przed sadzeniem, oprysk młodych sadzonek (0,2 %); 14 dni po sadzeniu; 2 do 4 oprysków podczas sezonu wegetacyjnego/uprawy.
Szczypiorek	2l/ha w 400 l wody	Po każdym ścięciu, 2 opryski w odstępie 8-14 dni.
Kalafior / Brokuły	2-3l/ha w 400 l wody	Moczenie/oprysk lub podlewanie/zraszanie młodych sadzonek (0,5 %); 10-12 dni po sadzeniu, a 2 do 4 zabiegów w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Kapusta pekińska	2-3l/ha w 400 l wody	Przed sadzeniem, oprysk młodych sadzonek (0,2 %); 14 dni po sadzeniu; 2 zabiegów każdego tygodnia.
Ogórki	2-3l/ha w 400 l wody	3 do 4 razy w odstępie 8-10 dni.
Pietruszka, seler, marchew	2-3l/ha w 400 l wody	Stadium 8-18 liści; 2-3 opryski w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Cebula, por	2-3l/ha w 400 l wody	3 do 4 razy w odstępie 8-10 dni.
Pomidory	3l/ha w 400 l wody	3 do 4 razy, aż do początku wybarwiania owoców.
Ziemiaki	1,5-2l/ha w 200 l wody	Zmieszany z preparatami grzybobójczymi 3-4 zabiegów od początku zawiązywania bulw.
Rzepak	1-2l/ha w 200 l wody	Faza 2-4 liści - BBC 32-50 - Kwitnienie
Zboża	1-2l/ha w 200 l wody	3 zabiegów w fazie 4-8 liści, w fazie pierwszego kolanka oraz od fazy liścia flagowego do początku kwitnienia.
Burak cukrowy, kukurydza	1-2l/ha w 200 l wody	Faza 4 liści.

*PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSZAĆ