

BIO BASSTYL GRAND

**Wieloskładnikowy, nieorganiczny,
mineralny nawóz CE zawierający
mikroelementy.
PFC 1 (C) (II) (b)**

CMC 1 Pierwotne surowce i minerały
Boroetyloamina (CAS:26038-87-9)

SKŁAD:

Bor (B) - 1%, rozpuszczalny w wodzie
Molibden (Mo) - 0,2%, w postaci soli
amonowej, rozpuszczalny w wodzie.
Cynk (Zn) - 1% w postaci siarczanu
rozpuszczalny w wodzie.

**Dodatkowo nawóz zawiera selen
oraz naturalne wyciągi roślinne typu
steroidowego.**



OPIS PRODUKTU:

Bio Basstyl Grand jest płynnym wieloskładnikowym nawozem mineralnym zawierającym mikroskładniki pokarmowe, bor, molibden i cynk. Nawóz zawiera pierwiastek korzystny, jakim jest selen, oraz naturalne wyciągi roślinne typu steroidowego. Może powodować wzrost stężenia brassinosteroidów w roślinie, przez co wykazuje działanie biostymulacyjne. Bio Basstyl Grand jest nawozem przeznaczonym do stosowania dolistnego oraz aplikacji poprzez fertygację. Nawóz wzmacnia metabolizm roślin, działa pozytywnie na wzrost elongacyjny roślin oraz stymuluje lepsze zawiązywanie pąków kwiatowych i kwitnienie roślin. Bio Basstyl Grand wspiera procesy zachodzące w czasie zapylania i zapłodnienia, wspiera podziału komórkowe, wspomaga rośliny w czasie stresowych warunków wywołanych czynnikami abiotycznymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ:

Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem. Wypełnić zbiornik do połowy wodą i wlać odmierzoną ilość preparatu Bio Basstyl Grand. Następnie wypełnić zbiornik do pełna, cały czas mieszając ciecz roboczą. Bio Basstyl Grand zaleca się stosować wcześniej rano lub wieczorem. Po użyciu pojemnik dobrze wypłukać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Używać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Nie przekraczać zalecanych dawek, przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych z dala od żywności i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Temperatura przechowywania - powyżej 5°C. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do dostarczenia produktu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Do stosowania zgodnie z zaleceniami i wykorzystaniem w danej uprawie.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduje długotrwale utrzymujące się niekorzystne zmiany.

P260 - Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy.

P273 - Nie wypuszczać do środowiska (uniknąć uwalniania do środowiska).

P391 - Zebrać wyciek.

P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P501 - Zawartość / pojemnik usuwać jak zawartość niebezpieczną.



CALFERT

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl

Zalecenia dolistnego stosowania nawozu Bio Basstyl Grand

UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKA
Jabłoń, grusza	Dwa-trzy zabiegi wykonać od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia. Kolejne zabiegi wykonywać od końca kwitnienia do około 4-6 tygodni po kwitnieniu.	0,2 l/ha
Wiśnia, czereśnia, śliwa	Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia. Kolejne zabiegi wykonywać od końca kwitnienia do 1 tygodnia przed zbiorem owoców.	0,2 l/ha
Truskawka	Pierwsze zabiegi wykonać od momentu pojawiania się pędów kwiatostanowych. Kolejne dwa-cztery zabiegi w odstępach co 7-10 dni należy wykonać w czasie kwitnienia. Wykonać dwa-trzy zabiegi od końca kwitnienia do momentu rozpoczęcia zbioru.	0,2 l/ha
Malina	Dwa-trzy zabiegi wykonać od momentu pojawiania się pąków kwiatostanowych. Wykonać dwa-trzy zabiegi w czasie kwitnienia.	0,2 l/ha
Borówka	Wykonać dwa-trzy zabiegi w czasie kwitnienia. Wykonać dwa-trzy zabiegi od końca kwitnienia do momentu rozpoczęcia zbioru owoców.	0,2 l/ha
Warzywa kapustne	Pierwszy zabieg należy wykonać po przyjęciu się rozsady w momencie intensywnego przyrostu roślin.	0,2 l/ha
Ogórek, pomidor, papryka	Wykonać dwa-trzy zabiegi od początku kwitnienia do jednego tygodnia przed zbiorem owoców.	0,2 l/ha
Warzywa	Wykonać dwa-trzy zabiegi od 2-4 tygodnia po wschodach co 7-10 dni.	0,2 l/ha
Zboża, rzepak	Jeden-dwa zabiegi wykonać jesienią po ukazaniu się pierwszych 2-3 liści właściwych. Dwa-trzy zabiegi wykonać wiosną w czasie intensywnego przyrostu masy zielonej.	0,2 l/ha
Ziemniak	Pierwszy zabieg wykonać 2-3 tygodnie po wschodach. Wykonać dwa - trzy zabiegi od momentu kwitnienia.	0,2 l/ha
Aplikacja wraz z fertygacją. Nawóz Bio Basstyl Grand można stosować wraz z fertygacją w uprawie roślin, w której jest możliwość podawania nawozów wraz z nawadnianiem kropłowym, przy wykorzystaniu urządzeń przeznaczonych do fertygacji. Nawóz można stosować w dawce 0,3 l/ha co 7-14 dni w uprawach jagodowych, sadowniczych i warzywniczych.		



CE
5l

masa netto 5.1kg

Data produkcji i numer partii:
na opakowaniu.

Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji.