


FERTIMAX COMPLEX NPK 12-11-18

MINERALNY, GRANULOWANY NAWÓZ NPK
Z MAGNEZEM, SIARKĄ I MIKROELEMENTAMI.
PRZEZNACZONY DO POSYPOWEGO STOSOWANIA
W UPRAWACH OGRODNICZYCH.



BEZPIECZNY DLA ROŚLIN:
Nawóz o bardzo niskiej
zawartości chlorków, nie
zawiera sodu ani innych
pierwiastków balastowych.

ZBILANSOWANY SKŁAD:

12%


azotu w formie
amonowej

11%

fosforu,
z czego 8,5% jest
rozpuszczalne w wodzie

18%

potasu w formie siarczanowej





WYSOKIEJ JAKOŚCI NIEBIESKIE GRANULE

BARDZO DOBRA ROZPUSZCZALNOŚĆ


Higroskopijne granule łatwo chłoną wilgoć z otoczenia. W krótkim czasie po wysiewie ulegają rozpuszczeniu, uwalniając składniki pokarmowe dostępne dla roślin.

NIEBIESKI KOLOR
łatwa identyfikacja
nawozu po wysiewie.



WYRÓWNANA GRANULACJA

95% produktu ma granule wielkości 2-5 mm, co zapewnia równomierną aplikację nawozu.



WYGODA STOSOWANIA

Zaletą nawozu jest to, że nie pyli podczas aplikacji. To znacznie zwiększa komfort pracy i bezpieczeństwo użytkownika.




MNIEJSZE DAWKI = WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ!


Stosuj regularnie, ale w mniejszych dawkach
– bez strat dla kieszeni i z korzyścią dla upraw!

Kompleksowe żywienie upraw ogrodniczych


FERTIMAX COMPLEX NPK 12-11-18



Masa jednego jabłka [g] odmiany Idared uzyskana w różnych programach nawożenia posypowego (Doradca Jagodowy 2019)



Średnica jabłka [mm] odmiany Idared uzyskana w różnych kombinacjach nawożenia posypowego (Doradca Jagodowy 2021)




Średni plon jabłoni [kg/drzewo] odmiany Idared uzyskany w różnych kombinacjach nawożenia posypowego (Doradca Jagodowy 2021)



Znajdziesz nas na www.calfert.pl

Dostępne opakowania:
worek PE 25 kg, BB 600 kg



ŁATWA APLIKACJA

Nawóz można aplikować przy użyciu przystawek i aplikatorów zamontowanych na różnych urządzeniach, takich jak glebogryzarki, sadzarki, opielacze czy maszyny do formowania podwyższonych zagonów.



NAWÓZ MOŻE BYĆ APLIKOWANY:

- przed siewem lub sadzeniem roślin i wymieszany z glebą,
- 2-4 tygodnie po siewie lub sadzeniu roślin,
- w czasie formowania zagonów,
- pogłównie w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Kontakt:

Calfert Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
biuro@calfert.pl

Albert
Rozwój i badania
+48 533 373 709

Jarek
Doradztwo
+48 722 108 106

Michał
Sprzedaż B2B
+48 790 333 852

Agnieszka
Marketing
+48 530 243 877