

CyBor AMINO PLUS

NAWÓZ WE

Mieszanina mikroelementów pokarmowych: Bor (B), Mangan (Mn), Molibden (Mo) i Cynk (Zn)



Skład (w/w):

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie – 6,9%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA – 0,77%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie – 0,38%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA – 3%

OPIS PRODUKTU

CyBor Amino Plus to dolistny nawóz zawierający ważne mikroelementy, takie jak bor w formie boretanoloaminy, cynk i mangan schelatowane przez EDTA, oraz molibden rozpuszczalny w wodzie. Nawóz zawiera również dodatek związku poprawiającego pobieranie składników pokarmowych przez liście i inne zielone części rośliny uprawnej. Nawóz należy stosować przede wszystkim w dwóch kluczowych dla roślin okresach: przed zakończeniem wegetacji, aby przygotować rośliny do spoczynku zimowego oraz na początku wegetacji, aby ułatwić jej prawidłowe rozpoczęcie aktywności fizjologicznej w danym sezonie. Dzięki zawartości cynku nawóz podnosi wytrzymałość roślin na niskie temperatury. Mangan sprzyja przemianom azotu oraz szybkiemu drewnieniu tkanek. Bor i molibden odgrywają szczególną rolę w okresie około kwitnienia oraz w czasie wzrostu i rozwoju zawiązków. Nawóz przeznaczony jest do pozakorzeniowej aplikacji w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywnych i rolniczych.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło. Przed zastosowaniem należy bardzo dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu CyBor Amino Plus, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości zbiornika. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Nawóz należy stosować w uzasadnionej potrzebie, w dawkach zalecanych podanych w tabeli.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz CyBor Amino Plus może wykazywać dobre zdolności do tworzenia mieszanin. Nie należy nawozu mieszać z preparatami miedziowymi. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić zdolność mieszania preparatów w mniejszym naczyniu. Użytkownik każdorazowo sporządza mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu z dala od dzieci. Nie należy przechowywać produktu z paszami i pożywieniem. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. W przypadku rozlania należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Podczas sporządzania cieczy roboczej oraz w czasie zabiegu należy stosować środki ochrony indywidualnej.

ZALECENIA

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKAW I/ha
Jabłoń, Grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi należy wykonać po pojawieniu się pierwszych zielonych części, i powtórzyć po 7 dniach. Kolejne zabiegi należy wykonać przed i po kwitnieniu	0,5-15 l/ha
	Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji	1-3 l/ha
Wiśnia, Czeresnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka	0,5-15 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po kwitnieniu w czasie wzrostu zawiązków	0,5-15 l/ha
	Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji	1-3 l/ha
Truskawki	Pierwsze 3-4 zabiegi co 7 dni wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka	1-2 l/ha
	Dla plantacji pozostawionych na kolejny sezon wegetacyjny ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców, a przed zakończeniem wegetacji	1,5-3 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych fazach rozwojowych do początku kwitnienia	0,5-15 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji	1-3 l/ha
Malina jesienna	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać na początku wegetacji w czasie intensywnego wzrostu pędów jednorocznych	0,5-15 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem koszenia pędów	1-3 l/ha
Borówka	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych fazach rozwojowych do początku kwitnienia	0,5-15 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji	0,5-15 l/ha
Zboża ozime	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać jesienią od fazy 3-6 liści	0,25-1 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną w czasie krzewienia	0,25-1 l/ha
Ziemniaki	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać od momentu zakrywania redlin przez roślinę	0,5-1 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego przyrostu	0,5-1 l/ha
Zboża jare	Pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści oraz powtórzyć w czasie krzewienia	0,25-1 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonać w fazie strzelania w źdźbło oraz powtórzyć w fazie liścia flagowego	0,25-1 l/ha
	Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści	0,25-1 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści	0,25-1 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści, powtórzyć po 7 dniach	0,5-15 l/ha
Rzepak	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy zwartego pąka	0,5-15 l/ha
Kapusta głowiasta, kapusta pekińska	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po sadzeniu roślin, kolejne 2-3 w fazie intensywnego przyrostu masy zielonej	1-2 l/ha
Marchewka, pietruszka, burak	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej	1-2 l/ha
Pomidór, papryka	Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po sadzeniu rozsady, kolejne 2-3 przed i na początku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych	1-2 l/ha
Ogórek	Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po sadzeniu rozsady, kolejne 2-3 przed i na początku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych	1-2 l/ha

Nr partii:

Data produkcji:

Okres przydatności do stosowania:
1 rok od daty produkcji

Objętość: **11**
(masa netto 1,39 kg)



CALFERT