

POTASIL PLUS KRZEM

NAWÓZ WE

TYP NAWOZU: C.2.9

ROZTWÓR NAWOZOWY NK 3-12



SKŁAD:

Azot całkowity 3% [m/m]

Azot amidowy 3% [m/m]

Potas (K_2O) rozpuszczalny
w wodzie 12% [m/m]

Krzem [SiO_2] 20% [m/m]

OPIS PRODUKTU

POTASIL PLUS KRZEM to płynny nawóz zawierający dwa ważne składniki pokarmowe: azot w postaci amidowej oraz potas rozpuszczalny w wodzie. Nawóz ten zawiera również wysoką zawartość krzemu w formie kwasu ortokrzemowego, który korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Dzięki wysokiej zawartości krzemu rośliny korzystnie reagują na żywienie składnikami zawartymi w nawozie POTASIL PLUS KRZEM. Stosowany regularnie w czasie wegetacji wzmacnia mechanicznie zewnętrzną warstwę woskową, epidermę oraz zmniejsza transpirację. Rośliny dobrze odżywione potasem i krzemem wykazują zwiększoną tolerancję na warunki stresowe takie jak susza, intensywne nasłonecznienie, wpływ wysokich lub niskich temperatur. Nawóz podwyższa odporność na infekcje ze strony patogenów oraz wzmacnia tkanki utrudniając żerowanie niektórych szkodników. POTASIL PLUS KRZEM stosowany w czasie wzrostu, dojrzewania i zbioru owoców poprawia jakość, smak oraz trwałość pozbiorniczą owoców. Zawarte w nawozie składniki poprawiają odporność roślin i ich owoców na uszkodzenia mechaniczne.

MIESZALNOŚĆ

POTASIL PLUS KRZEM posiada alkaliczny odczyn, dlatego nie należy go mieszać ze środkami o odczynie kwaśnym. Należy unikać mieszania preparatu z nawozami zawierającymi fosfor, wapń, siarkę, miedź, oleje mineralne. Produkt może wykazywać słabe zdolności co do tworzenia mieszanin zbiornikowych, należy zwrócić szczególną uwagę na ich sporządzanie. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej, należy wykonać próbę mieszania preparatu z innymi preparatami w mniejszej objętości wody.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 50% wodą wlać odmierzoną ilość POTASIL PLUS KRZEM, przy włączonym mieszadle, dopełnić zbiornik w 100%. Sporządzoną ciecz roboczą aplikować bezpośrednio po przygotowaniu.

INSTRUKCJA

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 35°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w zamknięciu z dala od dzieci. W przypadku rozlania wytrzeć, stosując środki ochrony indywidualnej, a zanieczyszczone miejsce dokładnie spłukać wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie spożywać, w przypadku połknięcia lub przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Podczas kontaktu z produktem stosować odzież ochronną, w tym rękawice, okulary, obuwie i płaszcz. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

POJEMNOŚĆ

5L

Masa netto: 6,75 kg



CALFERT

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8
tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

ZALECENIA STOSOWANIA

Uprawa	Termin stosowania	Dawka w l/ha
Jabłoni, Grusza	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać od fazy myślego ucha, do kwitnienia co 7 dni. Kolejne zabiegi 3-5 wykonać w czasie wzrostu i dojrzewania owoców co 7-14 dni.	2-3 l/ha
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać w fazie balona, 2-3 zabiegi po kwitnieniu, oraz 1-2 zabiegi pomiędzy poszczególnymi zbiorami owoców.	2-3 l/ha
Truskawka	Pierwsze 2-3 zabiegi co 7 dni wykonać od początku wegetacji do kwitnienia. Kolejne zabiegi wykonywać po kwitnieniu do końca zbioru owoców. Wykonać 1-2 zabiegi po zbiorach owoców, co 14-21 dni.	2-3 l/ha
Malina letnia	Pierwsze 2-3 zabiegi co 7-14 dni wykonywać w czasie od ruszenia wegetacji do kwitnienia. Kolejne 3-5 zabiegi wykonać po kwitnieniu w czasie dojrzewania owoców. Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców, co 14-21 dni.	2-3 l/ha
Malina powtarzająca owocowanie	Wykonać 3-5 zabiegów co 10-20 dni w czasie intensywnego przyrostu pędów jednorocznych. Kolejne 2-4 zabiegi co 7-14 dni wykonać po kwitnieniu owoców aż do końca zbioru.	2-3 l/ha
Borówka wysoka	Pierwsze 2-3 zabiegi co 7-14 dni wykonać od ruszenia wegetacji do kwitnienia, kolejne 3-5 zabiegów wykonywać od końca kwitnienia do końca zbioru owoców	2-3 l/ha
Warzywa kapustne	2-3 zabiegi co 7-14 dni w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej. Kolejne 1-2 zabiegi wykonać 20 i 10 dni przed planowanym zbiorem.	2-3 l/ha
Pomidor, Papryka, Ogórek w polu	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonywać w czasie intensywnego wzrostu fody i liści, kolejne 3-5 zabiegi wykonać w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	2-3 l/ha
Cebula, Por	Wykonać 2-3 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	1-2 l/ha
Burak cukrowy	Pierwszy zabieg wykonać przed zwraciem międzyrzędzi i powtórzyć 2-3 razy co 10-14 dni.	1-2 l/ha
Zboża	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu, kolejny w fazie liścia flagowego.	0,5-1,5 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać jesienią, kolejne 2-3 wiosną przed kwitnieniem.	1-2 l/ha
Kukurydza	Wykonać 2-3 zabiegi w fazie 4-8 liści.	0,5- 2 l/ha