


CALFERT MICRO MIEDŹ

Calfert Micro Miedź zawiera
w jednym litrze 385g miedzi
w formie tlenochlorku miedzi



OPIS NAWOZU

CALFERT MICRO MIEDŹ jest płynnym nawozem, w formie zawiesiny, przeznaczonym do dolistnego nawożenia roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych, szczególnie roślin o wysokim zapotrzebowaniu na miedź. Stosowanie nawozu przyczynia się do prawidłowego odżywienia roślin uprawnych miedzią oraz niwelacji deficytu tego pierwiastka. Regularnie stosowanie nawozu poprawia naturalną odporność roślin. Miedź zawarta w nawozie CALFERT MICRO MIEDŹ jest w formie tlenochlorku, dlatego zaleca się stosowanie nawozu we wczesnych i bardzo późnych fazach rozwojowych. Niewłaściwe i niezgodne z etykietą zastosowanie nawozu może powodować ordzawienie się zawiązków lub fitotoksyczność.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU DO OPRYSKU

Napełnić opryskiwacz do 2/3 objętości i włączyć mieszadło. Dodać nawóz CALFERT MICRO MIEDŹ w wymaganej ilości. Następnie można dodać odpowiednie środki ochrony roślin. Uzupełnić cieczą roboczą do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz aplikacji mieszadło opryskiwacza powinno być włączone. **Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.**

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w maksymalnie 4 warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniami słonecznymi. Temperatura przechowywania: od +5 do +30°C. Wstrząsnąć przed użyciem. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Pozostały roztwór wykorzystać do nawożenia.

NAWÓZ WE

nawóz miedziowy [Cu] zawieszinowy [tlenochlorek]

Skład nawozu w % [m/m]: Miedź [Cu] całkowita 26,0%.



CALFERT

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Jabłoń, Grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka – jabłoń i fazy białego pąka – grusza	1,5 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców	1-2 l/ha
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji	2-3 l/ha
	Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi w temperaturze nie wyższej niż 20°C	2-3 l/ha
Truskawki klasycznie owocujące	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji	1 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed spoczynkiem roślin	2 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, we wczesnych fazach rozwojowych	1 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed spoczynkiem roślin	1 l/ha
Malina jesienna	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dnia jesienią przed koszeniem pędów i liści	1-2 l/ha
Brzoskwinie	Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną w momencie ruszenia wegetacji	2 l/ha
Ziemniaki	Pierwszy zabieg wykonać od momentu zakrycia redlin przez roślinę	1,5-2 l/ha
	Drugi zabieg wykonać po 14 dniach od pierwszego	1,5-2 l/ha
Zboża	Zabieg wykonać w fazie krzewienia	1-1,5 l/ha

Nie mieszać z nawozami fosforowymi i preparatami zawierającymi kwas fosforowy. Nie mieszać ze środkami ochrony roślin zawierającymi mankozeb. Unikać stosowania przy przedłużających się okresach wysokiej wilgotności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Zgodnie z WE 1272/2008

Zawiera: tlenochlorek miedzi.

Uwaga



Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 456-19 65

e-mail: biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

Data ważności/nr partii/masa netto: na opakowaniu.