

CALFERT MACRO SIARKA

Roztwór siarczuanu magnezu typ D5.1

SKŁAD:

Tlenek magnezu (MgO)
rozpuszczalny w wodzie - 5%

Trójtlenek siarki (SO_3)
rozpuszczalnej w wodzie - 10%

Trójtlenek siarki (SO_3)
całkowity - 85%



NAWÓZ WE

OPIS PRODUKTU

CALFERT MACRO SIARKA to płynny, wysokoskoncentrowany, zawieszinowy nawóz dolistny zawierający dwa makroskładniki pokarmowe: siarkę i magnez. Zalecany jest do dolistnego stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych. CALFERT MACRO SIARKA niweluje deficyt siarki i magnezu w roślinach uprawnych. Poprawia odżywienie roślin wymagających podwyższonego nawożenia tymi makroskładnikami. Dzięki płynnej, wygodnej formulacji bardzo łatwo przygotować ten nawóz do sporządzania cieczy roboczej. Nawóz należy stosować zgodnie z etykietą.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszałdo. Przed zastosowaniem należy bardzo dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu CALFERT MACRO SIARKA, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości zbiornika. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszałdo powinno być włączone. Nie należy stosować preparatu podczas wysokich temperatur (powyżej $25^{\circ}C$), w czasie intensywnych operacji słonecznych oraz w czasie bardzo niskiej wilgotności powietrza (poniżej 75%). Podczas sporządzania cieczy roboczej oraz w czasie zabiegu należy stosować środki ochrony indywidualnej.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz CALFERT MACRO SIARKA może wykazywać słabe zdolności do tworzenia mieszanin. Nie należy nawozu mieszać z preparatami wapniowymi, fosforowymi, miedziowymi oraz preparatami zawierającymi kwas fosforowy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu z dala od dzieci. Nie należy przechowywać produktu z paszami i pożywieniem. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie spożywać! W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. W przypadku rozlania wytrzeć stosując środki ochrony indywidualnej a powierzchnię słufluć wodą.

Nr serii:

Data produkcji:

Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji



CALFERT

ZALECENIA

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA W l/ha
Jabłoni, Grusza	Pierwsze 3-5 zabiegów wykonać od momentu ruszenia wegetacji do fazy białego pąka	3-5 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców	3-5 l/ha
Wiśnia, Czeresnia, Sliwa	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka	3-5 l/ha
	Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi w temperaturze nie wyższej niż 20°C	2-3 l/ha
Truskawki	Pierwsze 3-5 zabiegów wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka	2-5 l/ha
	Dla odmian owocujących tradycyjnie wykonać 3-5 zabiegów co 14 dni po zbiorach owoców	2-4 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wcześniejszych fazach rozwojowych	2-4 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców	3-5 l/ha
Malina jesienna	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać na początku wegetacji do momentu intensywnego wzrostu pędów jednorocznych	1-4 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed koszeniem pędów i liści	3-5 l/ha
Zboża ozime	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać jesienią od fazy 3-6 liści	1-3 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną w czasie krzewienia	1-3 l/ha
Ziemniaki	Pierwsze 2-3 zabieg wykonać od momentu zakrywania redlin przez roślinę	2-4 l/ha
Zboża jare	Pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści, zabieg należy powtórzyć w czasie krzewienia	1-3 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonać w fazie strzelenia w źdźbło oraz powtórzyć w fazie liścia flagowego	1-3 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści	2-3 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści, powtórzyć po 7-14 dniach	2-4 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy zwanego pąka	2-4 l/ha
Warzywa kapustne	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej	2-5 l/ha
Warzywa korzeniowe	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej	2-5 l/ha
Warzywa psiankowate	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej przed kwitnieniem	2-5 l/ha
Warzywa dyniowe	Wykonywać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej przed kwitnieniem	2-5 l/ha

Objętość: **5 l**
(masa netto 6,75 kg)