

# ASKAN



## SKŁAD: (%w/w)

Azot całkowity (N-total) - 6,2%  
W tym azot organiczny - 2,8%; oraz azot amidowy (NH<sub>2</sub>) - 3,4%  
Tlenek potasu (K<sub>2</sub>O) rozpuszczalny w wodzie - 6 %  
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie - 0,1%  
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie, CuEDTA - 0,03%  
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie, FeEDTA - 0,1%  
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie, MnEDTA - 0,03%  
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie, Zn EDTA - 0,08%  
Węgiel organiczny (C-org.) - 10,3 %  
Nie zawiera chlorków



## OPIS PRODUKTU:

ASKAN jest nawozem mineralno-organicznym NK 6,2-6 z mikroelementami pokarmowymi takimi jak bor, miedź, mangan, żelazo i cynk. W produkcie znajdują się również związki organiczne takie jak aminokwasy, płynny ekstrakt z drożdży oraz wyciąg z alg brunatnych oraz dodatek mocznika. ASKAN to nawóz do aplikacji poprzez system fertygacji: dzięki mineralno-organicznej kompozycji nawóz zapewnia zrównoważony wzrost i rozwój rośliny, działając również stymulująco w okresach stresowych. Dzięki aplikacji poprzez fertygację wpływa na lepszy i intensywniejszy wzrost systemu korzeniowego, poprzez, który rośliny efektywniej pobierają wodę i składniki pokarmowe. Aplikację nawozu należy przeprowadzać w okresach stresowych dla rośliny oraz w najważniejszych momentach, gdy kształtuje się plon oraz jego jakość.

## MIESZALNOŚĆ:

ASKAN wykazuje dobre zdolności tworzenia mieszanin. Nie należy preparatu mieszać z innymi preparatami silnie alkalizującymi lub zakwaszającymi. Zalecane jest sprawdzenie mieszalności przed dodaniem preparatu do głównego zbiornika. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próby w mniejszej ilości wody. Wykonywanie mieszanin zbiornikowych tylko na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

ASKAN może być stosowany w większości upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych, po przez aplikację za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

## PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Odmierzoną dawkę nawozu ASKAN dodać do zbiornika. W nawożeniu poprzez fertygację podawać do instalacji nawodnieniowej całkowicie rozpuszczony nawóz w ustalonym stężeniu za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania pożywki. Po aplikacji nawozu całą instalację przepłukać czystą wodą. W nawożeniu dolistnym stosować poprzez aplikację pozakorzeniową przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych lub specjalistycznych.

## PRZECHOWYWANIE:

S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Przechowywać preparat w dobrze wentylowanych chłodnych suchych miejscach z dala od źródeł ciepła. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat zgodnie z etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia.



| Aplikacja nawozu ASKAN poprzez Fertygację |                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UPRAWA                                    | TERMINY I ZALECENIA                                                                                              | DAWKA       |
| Jabłoni, Grusza                           | Wykonywać aplikację od początku wegetacji do kwitnienia 2-3 zabiegi co 5-7 dni.                                  | 10-20/ ha   |
|                                           | Kolejne aplikacje wykonać po kwitnieniu, 2-3 razy co 7-14 dni oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.        | 10-20/ ha   |
| Wiśnia, Czeresznia, Śliwa                 | Wykonywać aplikację od początku wegetacji do kwitnienia 2-3 zabiegi co 5-7 dni.                                  | 10-20/ ha   |
|                                           | Kolejne aplikacje wykonać po kwitnieniu, 2-3 razy co 7-14 dni oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.        | 10-20/ ha   |
| Truskawka                                 | Pierwszą aplikację wykonać na początku wegetacji, potem kolejno 2-3 zabiegi co 7-10 dni do okresu kwitnienia.    | 10-20/ ha   |
|                                           | Kolejne aplikacje wykonywać w czasie kwitnienia i dojrzewania owoców oraz pomiędzy zbiorami                      | 10-20/ ha   |
|                                           | Wykonać 2-3 aplikacje po zbiorach owoców, szczególnie jeśli były koszone liście                                  | 10-20/ ha   |
|                                           | Wykonać 2-3 aplikacje po posadzeniu sadzonek roślin na miejsce stałe                                             | 3-6/ ha     |
| Malina                                    | Pierwszą aplikację wykonać po ruszeniu wegetacji.                                                                | 10-20/ ha   |
|                                           | Kolejne aplikacje co 14-21 dni wykonywać w czasie intensywnego przyrostu pędów i liści                           | 10-20/ ha   |
|                                           | Wykonywać aplikacje w czasie kwitnienia, owocowania i pomiędzy zbiorami owoców.                                  | 10-20/ ha   |
|                                           | Wykonać 2-3 aplikacje po posadzeniu sadzonek roślin na miejsce stałe                                             | 3-6/ ha     |
| Borówka                                   | Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną w momencie ruszenia wegetacji                                               | 10-20 l/ha  |
|                                           | Wykonać 1-3 aplikacje w czasie kwitnienia co 7-14 dni. Oraz po kwitnieniu w czasie wzrostu i dojrzewania owoców. | 10-20 l/ha  |
|                                           | Wykonać 2-3 aplikacje po posadzeniu sadzonek roślin na miejsce stałe                                             | 3-6 l/ ha   |
| Warzywa gruntowe                          | Pierwszy zabieg wykonać 7-14 dni po wschodach lub po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.                        | 3-6 l/ ha   |
|                                           | Kolejne zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu masy roślinnej.                                        | 6-12 l/ ha  |
|                                           | W razie problemów we wzroście roślin lub w czasie wystąpienia stresu wykonać zabieg i powtórzyć po 7-14 dniach.  | 10-15 l/ ha |

**APLIKACJA DOLISTNA** - Wszystkie uprawy: ASKAN można również stosować w zabiegach nawożenia dolistnego, w czasie całego okresu wegetacyjnego można wykonywać zabiegi nawożenia dolistnego co 10-15 dni w dawce 2-4 l/ha lub stężeniu 0,25 %

|               |                                                                                                     |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zboża, rzepak | W przypadku uprawy oziminy wykonać pierwszy zabieg 14-21 dni po wschodzie i powtórzyć po 14 dniach. | 2-3 l/ha |
|               | Wiosną po ruszeniu wegetacji lub 14 dni po wchodzie wykonać 2-3 zabiegi.                            | 3-4 l/ha |
| Ziemniak      | Pierwszy zabieg wykonać 7-14 po wchodach.                                                           | 3-4 l/ha |
|               | Kolejne 2-4 zabiegi co 7-14 dni w czasie intensywnego przyrastania masy zielonej.                   | 3-6 l/ha |

## INFORMACJE:

Pożywkę do podlewania roślin sporządzać w oparciu o analizę wody i gleby. Każdorazowo przed użyciem nawozu należy zapoznać się z potrzebami żywieniowymi roślin oraz przebiegiem warunków pogodowych. Dawkę wody użytą do podlewania dopasować do potrzeb nawodnienia danej uprawy oraz przebiegu warunków atmosferycznych. NFU 42-001 Preparat wprowadzony do obrotu wg. art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

Nr partii:

Data produkcji:

Termin przydatności:



CALFERT

6l

masa netto 7.14kg