

NEUTRASOL

SKŁAD (w/w):
Wapń (CaO) rozpuszczalny w wodzie - **9,0%**
Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie - **1,0%**

OPIS PRODUKTU:

NEUTRASOL to płynny nawóz mineralny zawierający wapń i magnez. Przeznaczony do żywienia roślin w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Nawóz można stosować wraz z nawadnianiem plantacji (fertygacja) oraz poprzez opryskiwanie gleby roztworem nawozu przy pomocy belki herbicydowej, a także w aplikacji nalistnej. Dzięki zawartości wapnia i magnezu Neutrasol uzupełnia niedobory tych składników pokarmowych, regulując odczyn gleby, dzięki czemu inne składniki mogą być efektywniej pobierane przez rośliny. Neutrasol poprawia wzrost i rozwój systemu korzeniowego, szczególnie w początkowym okresie jego wzrostu. Zawiera łatwo dostępny wapń — jeden z ważnych pierwiastków odpowiadających za budowę systemu korzeniowego. Regularna doglebowa aplikacja nawozu poprawia stosunki powietrzno — wodne w strefie korzeniowej oraz przyczynia się do poprawy struktury gleby. Nawóz korzystanie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych.


MIESZALNOŚĆ:

Neutrasol może być stosowany z większością powszechnie wykorzystywanych nawozów. Każdorazowo przed wykonaniem mieszanki zbiornikowej należy sprawdzić zdolność mieszania w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszankę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Neutrasol nie powinien być mieszany z preparatami zawierającymi siarczany, fosforany, z preparatami, w skład których wchodzi olej mineralne oraz z produktami alkalicznymi w aplikacji nalistnej.

PRZECHOWYWANIE:

Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich warunkach (np. w temperaturze poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu.

Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia. Przechowywać w dobrze wentylowanych, chłodnych, suchych miejscach i z dala od źródeł ciepła.



SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO FERTYGACJI:

Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Aby stosować Neutrasol wraz z fertygacją, produkt należy wstępnie rozpuścić w osobnym zbiorniku, stosując odmierzoną ilość nawozu Neutrasol. Ze zbiornika, w którym nawóz rozpuszczono w danej ilości wody, za pomocą instalacji nawodnieniowej nawóz podać pod rośliny w stosunku wynikającym ze specyfikacji wykorzystywanych urządzeń do nawadniania. Dawkę wody wykorzystywaną do podlewania wody należy skalkulować i modyfikować w zależności od warunków pogodowych, typu i rodzaju gleby, sposobu uprawy oraz uwzględnić gatunkowe i odmianowe potrzeby wodne roślin. Po aplikacji preparatu całą instalację należy przepłukać czystą wodą.

SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO APLIKACJI NALISTNEJ LUB OPRYSKIWIANIA GLEBY:

Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 wodą, wlewać Neutrasol przy włączonym mieszadle. Po dodaniu do zbiornika wszystkich produktów należy go wypełnić w całości wodą. Po sporządzeniu cieczy użytkowej należy przystąpić do wykonania aplikacji. Po zabiegu wszystkie elementy urządzenia należy dokładnie umyć czystą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat zgodnie z etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia. Zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: **H315** Działa drażniąco na skórę. **H319** Działa drażniąco na oczy. Zwrotu wskazujące środki ostrożności: **P264** Dokładnie umyć skórę i ręce po użyciu preparatu. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P280** Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. **P332 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza. **P337 + P313** Jeśli dojdzie do porażenia oczu, należy skontaktować się z lekarzem.

Aplikacja doglebowa poprzez opryskiwanie gleby za pomocą belki herbicydowej.		
UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKA
Drzewa i krzewy owocowe	Zabiegi można wykonywać przez cały okres wegetacji co 7-14 dni opryskując glebę pod roślinami.	5-10l/ ha
W zabiegu fertygacji za pomocą urządzeń podających roztwór nawozowy do instalacji nawodnieniowej.		
Jabłoń, Grusza	Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji.	5-10l/ ha
	Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego wzrostu, rozwoju i dojrzewania owoców.	5-10l/ ha
Wiśnia, Czeresnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji.	5-10l/ ha
	Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego wzrostu, rozwoju i dojrzewania owoców.	5-10l/ ha
Truskawka klasycznie owocująca	Pierwszą aplikację wykonać po ruszeniu wegetacji i powtórzyć po 7-14 dniach.	5-10l/ ha
	Kolejne zabiegi wykonać w czasie kwitnienia, po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców aż do zakończenia zbiorów.	5-10l/ ha
Malina letnia i jesienna	Pierwszą aplikację wykonać po ruszeniu wegetacji i powtórzyć po 7-14 dniach. Wykonać aplikację w czasie kwitnienia.	5-10l/ ha
	Kolejne aplikacje nawozu wykonać w czasie wzrostu, dojrzewania owoców oraz pomiędzy zbiorami.	5-10l/ ha
Truskawka powtarzająca owocowanie	Pierwszą aplikację wykonać 2-4 tygodnie po posadzeniu sadzonek, kolejne aplikacje wykonywać od momentu kwitnienia aż do zakończenia zbiorów.	5-10l/ ha
Warzywa kapustne	Pierwszą aplikację wykonać 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.	5-10l/ ha
	Kolejne aplikacje należy wykonać w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej oraz w momencie wiązania główek lub róż.	5-10l/ ha
Pomidor, papryka, ogórek	Pierwszą aplikację wykonać 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.	5-10l/ ha
	Kolejną aplikację wykonywać w czasie intensywnego przyrostu masy zielonej.	5-10l/ ha
	Kolejne aplikacje wykonać od momentu kwitnienia, w czasie wzrostu i dojrzewania owoców, aż do zakończenia zbiorów.	5-10l/ ha
Aplikacje za pomocą oprysku pozakorzeniowego		
Rzepak ozimy	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 4-6 liści, kolejne wiosną po ruszeniu wegetacji.	5l/ ha
Zboża ozime	Pierwszy zabieg wykonać jesienią, kolejne wiosną po ruszeniu wegetacji.	5l/ ha
Kukurydza	Wykonać zabieg w fazie 4-6 liścia.	5l/ ha
Ziemniak	Wykonać zabieg w czasie intensywnego przyrostu masy zielonej, kolejne zabiegi wykonać w czasie wiązania bulw.	5l/ ha
Burak cukrowy	Wykonać zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	5l/ ha
Warzywa kapustne Warzywa korzeniowe	Wykonać zabieg w czasie intensywnego przyrostu liści.	5l/ ha
Pomidor, papryka, ogórek	Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	5l/ ha
Drzewa owocowe	Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	5l/ ha
Krzewy owocowe	Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców	5l/ ha



CALFERT