

GLUKO MIEDŹ HGA

NFU 42-001

Preparat wprowadzony do obrotu
wg. art. 5 Ustawy o nawozach
i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

SKŁAD:

miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie - 5%
miedź (Cu) skompleksowana przez HGA - 5%
HGA - kwas heptaglukonowy
(związek kompleksujący)
stabilny zakres pH: 1-10



OPIS PRODUKTU:

Gluko Miedź HGA to płynny nawóz dolistny przeznaczony do żywienia roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych oraz upraw rolniczych. Specjalnie opracowana formuła połączenia miedzi z kompleksem związków glukonowych (HGA) występujących w roli chelatorów, zapewnia przyjazne dla roślin i środowiska odżywianie upraw miedzią. Gluko Miedź HGA dostarcza roślinom łatwo przyswajalną miedź, niezbędną w okresie deficytu tego pierwiastka lub okresach, gdy pobieranie miedzi jest ograniczone. Nawóz można stosować celem prawidłowego odżywienia roślin miedzią lub w czasie, gdy stwierdzone zostaną deficyty tego pierwiastka. Dzięki unikalnej kompozycji miedzi i związków glukonowych, nawóz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe pochodzenia biotycznego i abiotycznego.

MIESZALNOŚĆ:

Nawóz Gluko Miedź HGA ma ograniczenia w mieszaniu z innymi produktami. Nie należy nawozić mieszać z preparatami zawierającymi fosfor, siarkę, wapń, aminokwasy oraz miedź w innych formach. Nie należy mieszać produktu z substancjami o odczynie alkalicznym. Unikać stosowania przy przedłużających się okresach wysokiej temperatury. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszanki należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszankę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ:

Przed użyciem nawozu Gluko Miedź HGA należy wstrząsnąć opakowaniem. Napęścić zbiornik opryskiwacza w 3/4 wodą, włączyć mieszadło. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Gluko Miedź HGA, następnie można dodać inne preparaty. Zaleca się dodanie adiuwantu Optymal Film w dawkach rekomendowanych na etykiecie produktu. Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone.

PRZECZYSZCZANIE:

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w maksymalnie 3 warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od + 5 °C do + 30 °C. Przy rozlaniu należy zabrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie należy spożywać produktu. W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktuj się z lekarzem. Stosować okulary oraz rękawice ochronne i odzież ochronną. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.



UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKA
Jabłoń, Grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka jabłoni i fazy białego pąka grusza	2-3 l/ha
	Wykonać 1-2 zabiegi przed i po kwitnieniu	2-3 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców	2-3 l/ha
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, kolejne zabiegi wykonywać przed kwitnieniem	2-3 l/ha
	Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi	2-3 l/ha
Truskawka klasycznie owocująca	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji	1-2 l/ha
	W czasie okresu wegetacyjnego wykonać 2-3 zabiegi	1,5-2,5 l/ha
	Wykonać zabiegi 2-3 co 14 dni jesienią przed spoczynkiem roślin.	2-3 l/ha
Truskawka powtarzająca owocowanie	Pierwsze zabiegi wykonać 3-6 tygodni po sadzeniu roślin	0,5-2 l/ha
	W czasie okresu wegetacyjnego wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni	1-2 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, we wczesnych fazach rozwojowych	2-3 l/ha
	W czasie okresu wegetacyjnego wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni	1-2 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni po zbiorach owoców	1-2 l/ha
Malina jesienna	Wykonać 3-5 zabiegów co 14 dni w czasie intensywnego wzoru pędów jednorocznych	1-2 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed koszeniem pędów i liści.	1-2 l/ha
Brzoskwinia	Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną w momencie ruszenia wegetacji	2-3 l/ha
Warzywa kapustne	Pierwszy zabieg wykonać 2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe, kolejne 2-4 zabiegi wykonać co 14 dni w czasie okresu wegetacyjnego.	2-3 l/ha
Pomidor, papryka	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej i łodygi	2-3 l/ha
Ogórek	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	2-3 l/ha
Marchew, pietruszka, seler	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	2-3 l/ha
Zboża	Pierwszy zabieg wykonać w czasie pełni krzewienia, kolejny w czasie strzelania w źdźbło, ostatni zabieg wykonać w fazie liścia flagowego.	0,5-1,5 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu, kolejny przed kwitnieniem i powtórzyć po 7 dniach	1-2 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 6-9 liścia i powtórzyć po 7 dniach	1-2 l/ha

Produkt jest zgodny z Dekretem Królewskim 506/2013 odnoszącym się do produktów nawozowych. Załącznik I. Grupa 1.3.1.03. ROZTWÓR MIEDZI SKOMPLEKSOWANY HGA.

NFU 42-001

Preparat wprowadzony do obrotu
wg. art. 5 Ustawy o nawozach
i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

Data produkcji- 29/07/2022

Numer patii - 12667



11
masa netto 1.21kg