

AMINOVITAL

SKŁAD:

Wolne aminokwasy: 45%

Azot ogółem: 7%

Typ:

Płynny organiczny nawóz azotowy
do nawożenia dolistnego



OPIS PRODUKTU

AMINOVITAL jest organicznym nawozem dolistnym w formie płynnej, mającym zrównoważony pod kątem aminokwasów skład oraz zawierający wszystkie biologicznie aktywne L-alfa aminokwasy dostępne dla roślin. Produkt otrzymywany jest w procesie hydrolizy naturalnych białek. Dzięki szybkiej absorpcji przez liście i ułatwionemu transportowi w tkankach roślinnych, AMINOVITAL działa jako biostymulator w okresach stresu biotycznego i abiotycznego. Wolne aminokwasy zawarte w AMINOVITAL biorą udział w syntezie białek i w reakcjach enzymatycznych niezbędnych w rozwoju rośliny. Produkt ma właściwości poprawiające wydajność nawozów dolistnych i niektórych środków ochrony roślin.

MIESZALNOŚĆ

AMINOVITAL jest kompatybilny z większością zwykle stosowanych nawozów oraz agrochemikaliów, z wyłączeniem preparatów zawierających miedź, siarkę i produktów alkalicznych (pH>8). Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszanie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ani producent, ani dystrybutor nawozu nie odpowiadają za szkody i wady powstałe w wyniku sporządzanych mieszanin zbiornikowych.



CALFERT

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Wypełnić zbiornik do połowy wodą i wlać odmierzoną ilość preparatu AMINOVITAL. Następnie uzupełnić zbiornik do pełna cały czas mieszając ciecz roboczą. W celu ulepszenia nawożenia dolistnego aplikacja AMINOVITAL powinna odbyć się wcześniej rano lub wieczorem. Po użyciu pojemnik z nawozem dobrze wypłukać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4 °C do 35 °C.

Środki ostrożności: S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Nawóz przechowywać w transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 4°C do 35°C

Składowanie w nieodpowiednich warunkach (np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu. Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia.

NFU 42-001

Preparat wprowadzony do obrotu wg. art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

ZALECENIA STOSOWANIA

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Jablono, grusza	Od fazy zielonego pąka do kwitnienia: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	2-3 l/ha
	Po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców: 2-3 zabiegi co 7-10 dni.	2-3 l/ha
Wiśnia, czereśnia, śliwa	Od fazy białego pąka do kwitnienia: 2-3 zabiegi co 7 dni.	2-3 l/ha
	Po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców: 2-3 zabiegi co 7-10 dni.	2-3 l/ha
Truskawka	Od początku wegetacji do okresu kwitnienia: 3-4 zabiegi co 7-10 dni.	2-3 l/ha
	W czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu: 2 zabiegi co 7-10 dni.	1-2 l/ha
	W czasie wzrostu i dojrzewania owoców: 2-3 zabiegi co 7-10 dni.	1-2 l/ha
	14-21 dni po zbiorach owoców, szczególnie tuż po koszeniu liści: 2-3 zabiegi.	1-2 l/ha
Malina	Po ruszeniu wegetacji, gdy pojawiają się pierwsze młode w pełni wykształcone liście	2-3 l/ha
	W czasie intensywnego przyrostu pędów i liści: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	1-3 l/ha
	W okresie kwitnienia: 1-2 zabiegi co 7-14 dni.	1-3 l/ha
	Po zbiorach owoców malin odmian letnich: 1-2 zabiegi.	2-3 l/ha
Borówka	Po ruszeniu wegetacji, gdy pojawiają się pierwsze młode w pełni wykształcone liście.	2-3 l/ha
	W okresie kwitnienia: 1-2 zabiegi co 7-14 dni.	1-3 l/ha
	Po kwitnieniu, w czasie wzrostu i dojrzewania owoców: 2-3 zabiegi.	2-3 l/ha
	7-14 dni po wschodach lub po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.	2-3 l/ha
Warzywa gruntowe	Kolejne zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy roślinnej.	2-3 l/ha
	W razie problemów ze wzrostem lub w okresie wystąpienia stresu: 2 zabiegi co 7-14 dni.	2-3 l/ha
Zboża, rzepak	14-21 dni po wschodzie upraw ozimych: 2 zabiegi co 14 dni.	0,5-2 l/ha
	Wiosną po ruszeniu wegetacji lub 14 dni po wschodzie: 2-3 zabiegi.	0,5-2 l/ha
	W czasie intensywnego przyrostu: 2-3 zabiegi.	1-3 l/ha
Ziemniak	7-14 dni po wschodach.	1-3 l/ha
	W czasie intensywnego przyrastania masy zielonej: 2-4 zabiegi co 7-14 dni.	1-3 l/ha

Okres przydatności do stosowania: 3 lata od daty produkcji
Data produkcji i numer partii na opakowaniu

5 L

masa netto 6 kg



CALFERT