


CHITOFORCE TURBO

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ CE Z MIKROELEMENTAMI

Zawiera mikroskładniki pokarmowe w roztworze wodnym:
miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn).



Skład nawozu (% m/m):

Miedź (Cu) - schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie - 0,1%
Żelazo (Fe) - schelatowane przez DTPA, rozpuszczalne w wodzie - 1,2%
Mangan (Mn) - schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie - 0,5%
Cynk (Zn) - schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie - 0,3%
Odczyn 1% stężenia produktu w 20°C: pH 3-5

Frakcje schelatowane przez EDTA są stabilne w zakresie pH 4-9
Frakcje schelatowane przez DTPA są stabilne w zakresie pH 3-8



Składniki:

(1)CMCT: Pierwotne surowce i mieszaniny
Żelazo dicianowe DTPA(1) (CAS nr 85959-68-8),
Disodowa sól manganu EDTA(1) (CAS nr 15375-84-5),
Cynk disodowy EDTA(1) (CAS nr 14025-21-9)

OPIS PRODUKTU

CHITOFORCE TURBO to płynny nawóz dolistny i do fertygacji roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych, uprawianych w polu i pod osłonami. Specjalnie opracowana formuła oparta jest na połączeniu miedzi, manganu, cynku schelatowanych przez EDTA oraz żelaza schelatowanego przez DTPA z kompleksem związków zapewniających lepsze pobieranie przez rośliny mikroelementów zawartych w nawozie. Produkt zapewni łagodne dla roślin i środowiska odżywianie upraw mikroelementami. CHITOFORCE TURBO dostarcza roślinom doskonale przyswajalne miedź, cynk, żelazo i mangan niezbędne w okresie deficytu tych pierwiastków lub w okresach, gdy pobieranie mikroelementów jest ograniczone. Szczególnie zaleca się aplikację tego produktu na początku sezonu wegetacyjnego lub 14-21 dni po wysadzeniu roślin na miejsce stałe. Dzięki unikalnej kompozycji miedzi, manganu, żelaza i cynku oraz związków wspomagających nawóz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe pochodzenia biotycznego, niwelując niekorzystny wpływ stresu na fizjologię roślin.

SPORZĄDZANIE POŻYWKI NAWOZOWEJ DO FERTYGACJI

Odmierzoną dawkę CHITOFORCE TURBO wlać do mniejszego pojemnika i wymieszać dokładnie z wodą. Następnie wlać do właściwego pojemnika wypełnionego czystą wodą, z którego urządzenie do fertygacji będzie pobierało pożywkę nawozową do instalacji nawodnieniowej. Jeśli to możliwe, po dodaniu nawozu CHITOFORCE TURBO mieszać powstały roztwór w zbiorniku podczas podawania pożywki do fertygacji. Nawóz podawać z pojemnika za pomocą instalacji nawodnieniowej oraz posiadanych urządzeń do fertygacji w stosunku 1:100 (lub innym wynikającym ze specyfikacji posiadanych urządzeń lub sytuacji dotyczącej pożywki w strefę korzeniową roślin). Dawkę wody wykorzystaną do podlewania roślin należy skalkulować i modyfikować w oparciu o przebieg warunków pogodowych, rodzaj uprawy, typ i rodzaj gleby. Po zabiegu fertygacji zbiornik oraz wszystkie elementy instalacji do fertygacji i nawodnienia należy dokładnie przepłukać czystą wodą.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz CHITOFORCE TURBO może wykazywać słabe zdolności do tworzenia mieszanin. Nie należy mieszać nawozu z preparatami wapniowymi. Nie mieszać z preparatami zasadowymi. Każdorazowo przed stworzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ani producent, ani dystrybutor nawozu nie odpowiadają za szkody i wady powstałe w wyniku sporządzanych mieszanin zbiornikowych.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w maksymalnie trzech warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +8°C do +35°C. Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Przy rozładunku należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO APLIKACJI DOLISTNEJ

Przed użyciem nawozu CHITOFORCE TURBO należy wstrząsnąć opakowaniem. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu CHITOFORCE TURBO, nie przekraczać zalecanych dawek. Następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszało powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć, przepłukując czystą wodą.

ZALECENIA - aplikacja dolistna

Należy stosować się do zaleceń i nie przekraczać zalecanych dawek.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza, wisnia, czereśnia, brzoskwinia	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	2-3 l/ha
Truskawki w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	2-3 l/ha
Malina i jeżyna w polu i pod osłonami, borówka wysoka	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	2-3 l/ha
Salata, szpinak	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny.	1-2 l/ha
Pomidor, papryka w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po sadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	1-2 l/ha 2-3 l/ha
Arbuz, melon w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać 21 dni po starcie wegetacji. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	1-2 l/ha 2-3 l/ha
Ogórek z rozsady	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	1-2 l/ha 2-2,5 l/ha
Ogórek z siewu wprost do gruntu	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po wschodach. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	1,5 l/ha 2 l/ha

ZALECENIA - aplikacja poprzez fertygację

Należy stosować się do zaleceń i nie przekraczać zalecanych dawek.

Stężenie porzywki 0,04% czyli 4 l na 10 000 l wody.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	4 l/ha
Truskawka i malina w polu i pod osłonami	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	4 l/ha
Borówka wysoka	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	4 l/ha
Pomidor, papryka	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin na miejsce stałe. Drugi zabieg wykonać 14 dni po pierwszym zabiegu - jest to zabieg konieczny. Trzeci, opcjonalny zabieg wykonać 14-21 dni po drugim (jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba).	4 l/ha

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produktu nie należy spożywać. W przypadku połknięcia, skontaktuj się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu, skontaktuj się z lekarzem. Stosować okulary oraz rękawice ochronne i odzież ochronną. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:



Wyprodukowano we Włoszech

Data produkcji:

Data ważności:

Nr partii:



11

masa netto 1,13 kg

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl