

OPTYMAL FILM

SKŁAD:

Oligomery terpenowe – 96,3 % (w 100 % pochodzenia roślinnego)

OPIS PRODUKTU

OPTYMAL FILM to innowacyjny adiuwant do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin, nawozami dolistnymi, regulatorami wzrostu i biostymulatorami. **OPTYMAL FILM** korzystnie modyfikuje ciecz roboczą, zwiększając skuteczność wykonywanych zabiegów i wydłużając działanie aplikowanych substancji. Poprawia przyleganie cieczy roboczej do powierzchni liści (więcej substancji pozostaje na roślinie), dzięki czemu ciecz robocza w czasie zabiegu jest mniej podatna na znoszenie przez wiatr i splukiwanie przez deszcz.

- Ogranicza znoszenia kropeł przez poddmuchy wiatru i zmywanie przez deszcz substancji aktywnych z powierzchni rośliny.
- Przedłuża okres, w którym substancja aktywna może wnikać do rośliny.
- Tworzy ochronną warstwę na owocach, ograniczając ich pęknięcie.
- Przyczynia się do lepszego wykorzystania przez roślinę składników pokarmowych aplikowanych w zabiegach dolistnych.
- Zwiększa przylegania cieczy roboczej do powierzchni rośliny.

MIESZALNOŚĆ

OPTYMAL FILM może być mieszany z większością środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, regulatorów wzrostu lub biostymulatorów. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić możliwość mieszania preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własną odpowiedzialność.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci, miejsc narażonych na otwartą operację słoneczną oraz w pobliżu otwartego ognia. Nie przechowywać z żywnością i paszami. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C. W razie rozlania środka wytrzeć, stosując środki ochrony indywidualnej, zanieczyszczone miejsce dokładnie splukać wodą.



SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem.

Preparat wraz z wodą należy dobrze wymieszać. Z pojemnika preparat wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 80-90 % wodą. Roztwór z adiuwantem **OPTYMAL FILM** do zbiornika opryskiwacza wlewamy jako ostatni preparat, po uprzednim rozpuszczeniu się w wodzie wszystkich dodanych preparatów. Podczas dodawania do zbiornika roztworu z **OPTYMAL FILM** mieszadło musi być włączone. Po dodaniu do zbiornika wszystkich preparatów należy go wypełnić w całości wodą. W czasie przejazdu oraz w trakcie wykonywania zabiegu mieszadło musi być włączone.

DAWKOWANIE

Stosowanie	Dawka
Do środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, biostymulatorów i regulatorów wzrostu we wszystkich uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.	200 ml na każde 100 l wody (do 400 litrów wody na ha) 100 ml na każde 100 l wody (powyżej 500 litrów wody na ha)
Ograniczenie transpiracji młodych roślin zaraz po wysadzeniu rozsady w miejsce stałe.	200-400 ml na każde 10 l wody
Ograniczenie pęknięcia owoców czereśni i wiśni. Zabieg wykonać, gdy owoc osiągnie już swoją wielkość, ale przed procesem wybarwiania.	2-4 l na każde 100 l wody po upływie 7 i 14 dni zabieg należy powtórzyć

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- H315** działa drażniąco na skórę
- P280** stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy
- P332 + P313** w przypadku wystąpienia porażenia skóry zasięgnąć porady/ zgłosić się do lekarza
- P302 + P352** w przypadku KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P50** zawartość pojemnika poddać utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi.
- EUH401** w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją.



UWAGA

UFI:945V-89JD-2A2Y-Y2SK

1l

Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji: na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu



CALFERT

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl