


GLUKO MIEDŹ EXTRA

WIELOSKŁADNIKOWY, NIEORGANICZNY NAWÓZ
MIKROSKŁADNIKOWY z miedzią (Cu) i molibdenem (Mo)

(1)EMC1 Pierwotne surowce i mieszaniny:
di-D-glukopian miedzi (CAS n° 527-09-3)

Składniki (% M/M):

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie,
skompleksowana przez D-glukonian – 4,1%
Molibden (Mo) z molibdenianu sodu,
rozpuszczalny w wodzie – 0,003%
Odczyn zapewniający akceptowalną stabilność
frakcji schelatowanej – pH 4-9



UFI:ESU6-AX5E-W10R-P0QF

OPIS PRODUKTU

Gluko Miedź Extra to płynny nawóz przeznaczony do żywienia roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych oraz upraw rolniczych. Specjalnie opracowana formuła połączenia miedzi z kompleksem związków glukonowych występujących w roli chelatorów zapewnia przyjazne dla roślin i środowiska odżywianie upraw miedzią. Gluko Miedź Extra dostarcza roślinom łatwo przyswajalną miedź i molibden. Nawóz można stosować w celu prawidłowego odżywienia roślin miedzią i molibdenem, a także w czasie, gdy stwierdzone zostaną deficyty tych pierwiastków lub gdy ich pobieranie jest ograniczone. Dzięki unikalnej kompozycji miedzi i związków glukonowych, nawóz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe pochodzenia biotycznego i abiotycznego.

SPORZĄDZANIE POŻYWKI NAWOZOWEJ DO FERTYGACJI

Odmierzoną dawkę Gluko Miedź Extra wlać do mniejszego pojemnika i wymieszać dokładnie z wodą. Następnie wlać do właściwego pojemnika wypełnionego czystą wodą, z którego urządzenie do fertygacji będzie pobierać pożywkę nawozową do instalacji nawodnieniowej. Jeśli jest możliwość, po dodaniu nawozu Gluko Miedź Extra mieszać powstały roztwór w zbiorniku podczas podawania pożywki do fertygacji. Za pomocą instalacji nawodnieniowej z pojemnika podawać nawóz za pomocą posiadanego urządzenia do fertygacji w stosunku 1:100 (lub innym wynikającym ze specyfikacji posiadanych urządzeń lub sytuacji dotyczącej pożywki w strefie korzeniową roślin). Dawkę wody wykorzystaną do podlewania roślin należy skalkulować i modyfikować w oparciu o przebieg warunków pogodowych, rodzaju uprawy, typu i rodzaju gleby. Po zabiegu fertygacji zbiornik oraz wszystkie elementy instalacji do fertygacji i nawodnienia należy dokładnie przepłukać czystą wodą.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO ZABIEGÓW DOLISTNYCH

Przed użyciem nawozu Gluko Miedź Extra należy wstrząsnąć opakowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło w opryskiwaczu. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Gluko Miedź Extra, nie przekraczać zalecanych dawek, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć bądź przepłukać czystą wodą.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz Gluko Miedź Extra ma ograniczenia w mieszaniu z innymi produktami. Nie należy go mieszać z preparatami fosforowymi, siarkowymi, miedziowymi, wapniowymi oraz preparatami zawierającymi miedź w innych formach, a także z preparatami aminokwasowymi i olejowymi. Nie należy mieszać produktu z substancjami o odczynie alkalicznym. Każdorazowo przed stworzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w maksymalnie 3 warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +8°C do +30°C. Przy rozlaniu należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

ZALECENIA APLIKACJI DOLISTNEJ

Przed użyciem wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanych dawek ani liczby aplikacji w sezonie.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka (jabłoni) i fazy białego pąka (grusza). Wykonać 1-2 zabiegi przed kwitnieniem i po kwitnieniu.	1-1,5 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców.	2-3 l/ha
Wiśnia, czereśnia, śliwa	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, kolejne zabiegi wykonywać przed kwitnieniem. Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi.	2-3 l/ha
Truskawki klasycznie owocujące	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji. W czasie okresu wegetacyjnego wykonać 2-3 zabiegi. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed spoczynkiem roślin.	1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1-2 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, we wczesnych fazach rozwojowych. W czasie wegetacji wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni po zbiorach owoców.	1-1,5 l/ha 1 l/ha 1-2 l/ha
Malina jesienna	Wykonać 3-5 zabiegów co 14 dni w czasie intensywnego wzoru pędów jednorocznych. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed koszeniem pędów i liści.	1-1,5 l/ha
Brzoskwinie	Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną w momencie ruszenia wegetacji.	1-1,5 l/ha
Warzywa kapusne	Pierwszy zabieg wykonać 2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe, kolejne 2-4 zabiegi wykonać co 14 dni w czasie wegetacji.	0,75-1,5 l/ha
Pomidor, papryka	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej i łodygi.	1-1,5 l/ha
Ogórek, marchew, pietruszka, seler	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	1-1,5 l/ha
Zboża	Pierwszy zabieg wykonać w czasie pełni krzewienia, kolejny w czasie strzelania w zdźbło, ostatni zabieg wykonać w fazie liścia flagowego.	0,5-1,5 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu, kolejny przed kwitnieniem i powtórzyć po 7 dniach.	0,5-1,5 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 6-9, liścia i powtórzyć po 7 dniach	0,5-1,5 l/ha

ZALECENIA APLIKACJI ZA POMOCĄ FERTYGACJI

Przed użyciem wstrząsnąć. Gluko Miedź Extra stosować maksymalnie 2 do 4 razy za pomocą fertygacji w sezonie wegetacyjnym.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji. Kolejne 1-2 zabiegi wykonać przed kwitnieniem i po kwitnieniu oraz jeden zabieg po zbiorach owoców.	4 l/ha
Truskawka, malina, borówka, jeżyna	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, powtórzyć 2 razy co 7-14 dni.	4 l/ha
Warzywa uprawiane w gruncie	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 od sadzenia lub wschodów, powtórzyć 2-3 razy co 7-14 dni.	4 l/ha

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce i inne części ciała po użyciu produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P317 Zebrać wyciek.



Data produkcji:
Termin ważności 3 lata
Nr partii:

1L
masa netto: 1.21 kg

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl


GLUKO MIEDŹ EXTRA

WIELOSKŁADNIKOWY, NIEORGANICZNY NAWÓZ
MIKROSKŁADNIKOWY z miedzią (Cu) i molibdenem (Mo)

(1)EMC1 Pierwotne surowce i mieszaniny:
di-D-glukopian miedzi (CAS n° 527-09-3)

Składniki (% M/M):

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie,
skompleksowana przez D-glukonian – 4,1%
Molibden (Mo) z molibdenianu sodu,
rozpuszczalny w wodzie – 0,003%
Odczyn zapewniający akceptowalną stabilność
frakcji schelatowanej – pH 4-9



UFI:ESU6-AX5E-W10R-P0QF

OPIS PRODUKTU

Gluko Miedź Extra to płynny nawóz przeznaczony do żywienia roślin jądowych, sadowniczych, warzywniczych oraz upraw rolniczych. Specjalnie opracowana formuła połączenia miedzi z kompleksem związków glukonowych występujących w roli chelatorów zapewnia przyjazne dla roślin i środowiska odżywianie upraw miedzią. Gluko Miedź Extra dostarcza roślinom łatwo przyswajalną miedź i molibden. Nawóz można stosować w celu prawidłowego odżywienia roślin miedzią i molibdenem, a także w czasie, gdy stwierdzone zostaną deficyty tych pierwiastków lub gdy ich pobieranie jest ograniczone. Dzięki unikalnej kompozycji miedzi i związków glukonowych, nawóz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe pochodzenia biotycznego i abiotycznego.

SPORZĄDZANIE POŻYWKI NAWOZOWEJ DO FERTYGACJI

Odmierzoną dawkę Gluko Miedź Extra wlać do mniejszego pojemnika i wymieszać dokładnie z wodą. Następnie wlać do właściwego pojemnika wypełnionego czystą wodą, z którego urządzenie do fertygacji będzie pobierać pożywkę nawozową do instalacji nawodnieniowej. Jeśli jest możliwość, po dodaniu nawozu Gluko Miedź Extra mieszać powstały roztwór w zbiorniku podczas podawania pożywki do fertygacji. Za pomocą instalacji nawodnieniowej z pojemnika podawać nawóz za pomocą posiadanego urządzenia do fertygacji w stosunku 1:100 (lub innym wynikającym ze specyfikacji posiadanych urządzeń lub sytuacji dotyczącej pożywki w strefie korzeniową roślin). Dawkę wody wykorzystaną do podlewania roślin należy skalkulować i modyfikować w oparciu o przebieg warunków pogodowych, rodzaju uprawy, typu i rodzaju gleby. Po zabiegu fertygacji zbiornik oraz wszystkie elementy instalacji do fertygacji i nawodnienia należy dokładnie przepłukać czystą wodą.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO ZABIEGÓW DOLISTNYCH

Przed użyciem nawozu Gluko Miedź Extra należy wstrząsnąć opakowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło w opryskiwaczu. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Gluko Miedź Extra, nie przekraczać zalecanych dawek, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć bądź przepłukać czystą wodą.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz Gluko Miedź Extra ma ograniczenia w mieszaniu z innymi produktami. Nie należy go mieszać z preparatami fosforowymi, siarkowymi, miedziowymi, wapniowymi oraz preparatami zawierającymi miedź w innych formach, a także z preparatami aminokwasowymi i olejowymi. Nie należy mieszać produktu z substancjami o odczynie alkalicznym. Każdorazowo przed stworzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w maksymalnie 3 warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +8°C do +30°C. Przy rozlaniu należy zebrać ciecz, a powierzchnię splukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

ZALECENIA APLIKACJI DOLISTNEJ

Przed użyciem wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanych dawek ani liczby aplikacji w sezonie.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka (jabłoni) i fazy białego pąka (grusza). Wykonać 1-2 zabiegi przed kwitnieniem i po kwitnieniu.	1-1,5 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców.	2-3 l/ha
Wiśnia, czereśnia, śliwa	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, kolejne zabiegi wykonywać przed kwitnieniem. Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi.	2-3 l/ha
Truskawki klasycznie owocujące	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji. W czasie okresu wegetacyjnego wykonać 2-3 zabiegi. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed spoczynkiem roślin.	1-1,5 l/ha 1,5 l/ha 1-2 l/ha
Malina letnia	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, we wczesnych fazach rozwojowych. W czasie wegetacji wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni po zbiorach owoców.	1-1,5 l/ha 1 l/ha 1-2 l/ha
Malina jesienna	Wykonać 3-5 zabiegów co 14 dni w czasie intensywnego wzoru pędów jednorocznych. Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed koszeniem pędów i liści.	1-1,5 l/ha
Brzoskwinie	Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną w momencie ruszenia wegetacji.	1-1,5 l/ha
Warzywa kapusne	Pierwszy zabieg wykonać 2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe, kolejne 2-4 zabiegi wykonać co 14 dni w czasie wegetacji.	0,75-1,5 l/ha
Pomidor, papryka	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej i łodygi.	1-1,5 l/ha
Ogórek, marchew, pietruszka, seler	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	1-1,5 l/ha
Zboża	Pierwszy zabieg wykonać w czasie pełni krzewienia, kolejny w czasie strzelania w zdźbło, ostatni zabieg wykonać w fazie liścia flagowego.	0,5-1,5 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać w czasie intensywnego wzrostu, kolejny przed kwitnieniem i powtórzyć po 7 dniach.	0,5-1,5 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 6-9, liścia i powtórzyć po 7 dniach	0,5-1,5 l/ha

ZALECENIA APLIKACJI ZA POMOCĄ FERTYGACJI

Przed użyciem wstrząsnąć. Gluko Miedź Extra stosować maksymalnie 2 do 4 razy za pomocą fertygacji w sezonie wegetacyjnym.

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKA
Jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia	Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji. Kolejne 1-2 zabiegi wykonać przed kwitnieniem i po kwitnieniu oraz jeden zabieg po zbiorach owoców.	4 l/ha
Truskawka, malina, borówka, jeżyna	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji, powtórzyć 2 razy co 7-14 dni.	4 l/ha
Warzywa uprawiane w gruncie	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 od sadzenia lub wschodów, powtórzyć 2-3 razy co 7-14 dni.	4 l/ha

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce i inne części ciała po użyciu produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P317 Zebrać wyciek.



Data produkcji:
Termin ważności 3 lata
Nr partii:

6L
masa netto: 7.26 kg

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl